



FICHE D'INFORMATION TOXINE BOTULIQUE

La toxine botulique est issue de la culture d'une bactérie, clostridium botulinum. Elle est utilisée depuis plusieurs années en ophtalmologie , neurologie et dermatologie

Son utilisation en dermatologie se fait pour le traitement de certaines rides du 1/3 supérieur du visage permettant d'éviter le lifting frontal et l'hypersudation des aisselles.

Elle est commercialisée sous trois noms :

Vistabel (Allergan) , **Azzalure** (Galderma) et **Bocouture** (Merz)

Mode d'action :

La toxine botulinique diminue la contraction des muscles en agissant au niveau de la jonction entre le nerf et le muscle (relaxation musculaire)

Indications :

Rides du lion (rides de la glabelle)

Rides du front

Rides de la pattes d'oie

Rides de « buny » sur les cotés du nez quand vous fronchez le nez

Décontraction des crispations du menton

Transpiration excessive des aisselles

Déroulement de l'injection

Le jour de l'injection vous n'avez pas besoin d'être à jeun

Venir démaquillée dans la mesure du possible

L'injection se pratiquement indolore se fait dans les points préalablement choisis

Pendant les 6 heures qui suivent , il est recommandé de ne pas faire de sport intensif et de ne pas vous allonger

Il faut également éviter toute pression (attention au port d'un casque éventuel) ou massages locaux pendant les 24 heures qui suivent la séance pour limiter le risque de diffusion du produit vers les muscles périphériques (effets non désirés)

Il est très important de minimiser les risques de bleus ou de saignements des régions traitées , en ne prenant pas d'aspirine ou de médicaments anticoagulants , pendant les 8 jours qui précèdent et suivent les injections.

Résultat :

Il est visible au bout de quelques jours . cependant pendant les quinze premiers jours , les effets peuvent être variables voire asymétriques parfois avant de finir par se stabiliser.

Lors de la première injection les effets durent 4 mois , ils se prolongeront plus longtemps avec la répétition des injections (6 à 8 mois).

Les injections doivent être réalisées plusieurs fois à 4 à 6 mois d'intervalle pour obtenir une certaine stabilité du résultat.

Il est recommandé de respecter un délai minimum de 3 mois entre deux injections pour éviter de créer un effet vaccin (résistance au produit).

En cas de peau épaisse ou de « cassure profonde » on pourra réaliser un complément de traitement par injection de comblement qui optimisera le résultat.

Précautions avant traitement :

Vous devez informer votre dermatologue :

Si vous êtes déjà traité par des injections de toxines botulinique pour des spasmes de la face , si vous avez eu un épisode de paralysie des muscles de la face , si vous souffrez d'une maladie neuromusculaire , d'un thymome ou de trouble de la coagulation. Il jugera de l'opportunité des injections sur votre personne

Si vous prenez des médicaments de la famille des aminosides (antibiotiques), des anticoagulants ou de l'aspirine , si vous êtes allergique à l'œuf ou l'albumine. L'injection de toxine botulique type azzalure ou vistabelle est contre indiquée

Le fait d'être enceinte même de quelques jours nécessite de repousser la date des injections après la grossesse et un éventuel allaitement

D'une manière générale vous devez mentionner à votre dermatologue le moindre problème de santé rencontré pour qu'il apprécie l'opportunité des injections

Risques :

Ils sont transitoires rares mais peuvent être gênants :

Localement : rougeur ou bleu au point d'injection, gonflement autour des yeux qui peut s'installer en 4 à 5 jours et décroître ensuite en quelques jours ou semaines, troubles de la sensibilité avec sensation de tension du front ou fixité , douleurs fugaces oculaires ou faciales.

Imperfection de résultats : persistance de ridules , asymétrie , surélévation d'un sourcil , trouble de la mimique . Elles feront l'objet d'une correction rapide par une retouche d'injection de toxine

Complications : maux de tête , descente du sourcil ou de la paupière, sécheresse oculaire et de manière très exceptionnelle : allergie , nausées , vertiges , fatigue , syndrome grippal, sécheresse cutanée et buccale

Les actes à visée esthétique en particulier la toxine botulinique ont pour objectif de vous satisfaire dans des proportions réalistes. Il arrive cependant que l'effet escompté ne soit pas atteint. Le vécu post injections peut être extrêmement différent d'un patient à l'autre , et ce , même avec un résultat esthétique comparable ;

Taris de la séance :

Front + glabelle : 300 euros TTC

Patte d'oie : 300 euros TTC

1/3 sup du visage : 400 euros TTC

Menton : 100 euros TTC

Transpiration excessive des aisselles : 550 euros TTC (une seule séance par an est nécessaire)

Consentement :

Votre dermatologue par cette fiche vous a communiqué toutes les informations sur les éventuels aléas relatif à ce type d'intervention, les effets secondaires possibles , les inconvénients mineurs et les risques connus inhérents à cet acte médical, et a discuté avec vous des alternatives chirurgicales ou thérapeutiques. Votre consentement aux injections fait suite à cette information détaillée et suffisamment claire pour arrêter un choix. Si l'un quelconque de ces points restait incompris , vous devez lui en faire part maintenant.

Cette correction n'est pas prise en charge par la sécurité sociale.

Pour toute question vous pouvez joindre le cabinet par :

Téléphone : 05-59-000-359

Email : cabinet.sophie.loubeyres@orange.fr

Signature du patient

signature du médecin